

NHG-Tabel 56-Profylaxe, versie 5 Inkijkexemplaar

Maart 2020

© Nederlands Huisartsen Genootschap



Omschrijving	Toelichting
Addison crisis profylaxe	Bij ernstig mentale stress of bij fysieke stresssituaties, zoals bij ziekte, koorts of een ongeval, dient de (hydro)cortisondosering verdubbeld of verdrievoudigd te worden (minimaal 40 mg/dag) ter voorkoming van een Addison crisis. Dien, indien orale inname niet mogelijk is, 100 mg hydrocortison of eventueel 25 mg prednisolon intramusculair of intraveneus toe. Overleg in alle gevallen met de dienstdoende endocrinoloog. (Bron: Ontregelingskaart Addison-crisis van NHG, Ineen, NVACP 2014)
Endocarditis profylaxe	Maatregelen ter voorkoming van endocarditis. Bijvoorbeeld na correctie van een VSD, waarvoor antibiotica geïndiceerd is in de eerste 6 maanden na de ingreep. (Bron: NHG-Behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe 2016)
Profylaxe bij bloedingsziekten	Hieronder vallen voorzorgsmaatregelen zoals die bij specifiek optredende events nodig zijn. Bijvoorbeeld: cave gewrichtsbloeding bij trauma, laagdrempelig insturen voor toediening stollingsfactorpreparaat; of bij kiesextracties starten met tranexaminezuur. (Bron: Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen 2009 Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars, NVHB)
Profylaxe bij endoprothese	Geef antibioticaprofylaxe (flucloxacilline of clindamycine bij penicilline-overgevoeligheid) 30-60 minuten voorafgaand aan incisie van een abces bij een gewrichtsprothese < 2 jaar oud of een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde gewrichtsprothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie. (Bron: NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties 2017)
Profylaxe bij immuun gecompromitteerde patient	Maatregelen of voorzorgen bij specifieke immunostatoornissen, zoals IgA-deficiëntie, SCID of Aids of bij het gebruik van immunosuppressieve medicatie. Bijvoorbeeld: geen levend-verzwakte vaccinaties geven. Soms is er verminderde immunerespons op vaccins en moet titercontrole worden overwogen. Overweeg laagdrempelig antibiotica. (Bron: NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties 2017, NHG-Standaard Artritis 2017, LCR protocollen afweerstoornissen 2012-2019)
Profylaxe bij (functionele) asplenie	Het gaat hier om maatregelen naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis bij patiënten met een (functionele) asplenie. Bijvoorbeeld: bij koorts, honden- of kattenbeet: start antibiotica (amoxicilline/clavulaanzuur 50/12.5 mg/kg/dg in 3 doses, maximaal 3 dd 500/125 mg); bij reizen: zorgvuldige toepassing van malariaprofylaxe en alertheid op tekenbeten (Babesiosis). (Bron: NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties 2017; LCI-richtlijn Preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie 2018)
Trombose profylaxe	Ter preventie van het posttrombotisch syndroom worden de steunkousen twee jaar gedragen. Na een jaar kan desgewenst worden nagegaan of het been slank blijft zonder steunkousen. (Bron: NHG-standaard Diepe veneuze trombose en longembolie 2017, Richtlijn lymfoedeem 2014 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie)
Profylaxe bij bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)	Algemene voorzorgsmaatregelen op het gebied van handhygiëne, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij opname in (psychiatrische) ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en voorzieningen voor kleinschalige woonvormen voor ouderen zijn aanvullende maatregelen nodig en wordt bij verwijzing dragerschap van BRMO gemeld. (Bron: LCI richtlijn BRMO 2014)