


NHG-Tabel 25 - Gebruiksvoorschrift - Inkijkexemplaar

Inkijkexemplaar datum: 17-03-2026

Behorende bij NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift, versie 12, datum 17-03-2026

©Nederlands Huisartsen Genootschap

Legenda:

- ★ Nieuwe items - in groen
-  Gewijzigde items - in blauw
- ✘ Vervallen items - in rood

Tijdseenheden

Memo	Omschrijving
;	(nvt/afbr)
D	per dag
DA	per 8 dagen
DD	per 3 dagen
DE	per 11 dagen
DN	per 9 dagen
DQ	per 5 dagen
DT	per 2 dagen
DV	per 4 dagen
DW	per 12 dagen
DX	per 10 dagen
DZ	per 6 dagen
J	per jaar
JA	per 8 jaar
JD	per 3 jaar
JH	per half jaar
JQ	per 5 jaar
JT	per 2 jaar
JV	per 4 jaar
JZ	per 6 jaar
M	per maand
MA	per 8 maanden
MC	per 18 maanden
MD	per 3 maanden
ME	per 11 maanden
MN	per 9 maanden
MQ	per 5 maanden
MS	per 7 maanden

Memo	Omschrijving
MT	per 2 maanden
MV	per 4 maanden
MX	per 10 maanden
MZ	per 6 maanden
O	om de dag
U	per uur
UA	per 8 uur
UD	per 3 uur
UE	per 11 uur
UH	per half uur
UN	per 9 uur
UQ	per 5 uur
US	per 7 uur
UT	per 2 uur
UV	per 4 uur
UW	per 12 uur
UX	per 10 uur
UZ	per 6 uur
W	per week
WA	per 8 weken
WD	per 3 weken
WE	per 11 weken
WN	per 9 weken
WQ	per 5 weken
WS	per 7 weken
WT	per 2 weken
WV	per 4 weken
WW	per 12 weken
WX	per 10 weken
WZ	per 6 weken
E	eenmalig

Eenheden gebruiksadvies

Gesorteerd op omschrijving.

Mnem.	Omschrijving	Eenh.G-std*	Hoev.in G-eenh.
;	(nvt/afbr)		
AM	ampul	ST	1
AV	applicatorvulling	DO	1
BR	bruistablet	ST	1
C	capsule	ST	1

Mnem.	Omschrijving	Eenh.G-std*	Hoev.in G-eenh.
CM	centimeter	CM	1
CR	creme		
DO	dosis	DO	1
D	dragee	ST	1
DR	druppel	DR	1
EH	eenheid	E	1
FT	finger tip unit	G	0,5
GZ	gaas	ST	1
GE	gel		
GR	gram	G	1
I	inhalatie	DO	1
IJ	injectie	ST	1
IU	IUD	ST	1
KW	kauwgom	ST	1
KL	klysma	ST	1
KO	korrel	ST	1
LO	lotion		
UG	microgram	UG	1
MG	milligram	MG	1
ML	milliliter	ML	1
OG	oogdruppel	DR	1
O	oplossing		
OV	ovule	ST	1
PL	pleister	ST	1
PB	pompbeweging	DO	1
PF	pufje	DO	1
SA	sachet	ST	1
SH	shampoo		
SP	spray	DO	
CS	strooipoeder		
SK	stuk	ST	1
T	tablet	ST	1
VU	verstuiving	DO	1
Z	zakje	ST	1
ZA	zalf		
S	zetspil	ST	1

*In de kolom eenheid in de G-Standaard zijn de codes gebruikt uit de G-Standaard:

CM	Centimeter	L	Liter	ST	Stuk
DO	Dosis	M	Meter	UG	Microgram
DR	Druppel	MG	Microgram	UL	Microliter
E	Eenheid	ML	Milliliter	VP	Verpakking
G	Gram	MM	Millimeter		
KG	Kilogram				

Aanvullende teksten


Geordend per categorie.

Memo	Omschrijving
	101 - Maaltijden en slapen
1VWM	1 uur voor de warme maaltijd innemen
1V1NE	1 uur voor of 1 uur na het eten innemen
1V2NE	1 uur voor of 2 uur na het eten innemen
1VEV	Bij voorkeur 1 uur voor het eten innemen
HVEV	Bij voorkeur een half uur VOOR het eten
B1UNE	Binnen 1 uur na het eten innemen
B1UVE	Binnen 1 uur voor het eten inspuiten
BHNE	Binnen 30 minuten na het eten innemen
HNE	Een half uur na het eten innemen
HVO	Een half uur voor het ontbijt
NUCHT	Innemen op nuchtere maag
KVKNE	Kort voor of kort na het eten
VTE	Kort voor of tijdens het eten
NM	Na de maaltijd
NO	Na het ontbijt
O2V2N	Of 2 uur voor/na lunch/avondeten innemen
OHVO	Of ten minste een half uur voor ontbijt
AVBM	's Avonds innemen bij de maaltijd
1VE	Ten minste 1 uur VOOR het eten innemen
T1UVO	Ten minste 1 uur VOOR het ontbijt
15MVE	Ten minste 15 minuten VOOR het eten
HVE	Ten minste een half uur VOOR het eten
HVOI	Ten minste half uur VOOR ontbijt innemen
TWM	TIJDENS de warme maaltijd innemen
TE	TIJDENS het eten innemen
TE1U	TIJDENS het eten of binnen 1 uur erna
TO	Tijdens het ontbijt
TNE	TIJDENS of vlak NA het eten innemen
VVE	Vlak VOOR het eten innemen
VM	Voor de maaltijd
VS	Voor het slapen
	102 - Toepassing
ABR	Aanbrengen
AST	Aanstippen
COL	Met 1 druppel bedekken, laten drogen
DEP	Deppen
IHB	In het badwater
IM	Voor i.m. injectie
INH	Inhaleren
INM	Inmasseren
INS	Insmeren
IV	Intraveneus injecteren
IVA	In vernevelapparaat
OT	Onder de tong

Memo	Omschrijving
R	Rectaal inbrengen
UG	Voor uitwendig gebruik
SC	Voor s.c. injectie
	103 - Conditie
BB	Bij benauwd zijn 
BDI	Bij diarree
BAV	Bij een aanval
BHST	Bij hoest
BHK	Bij hoge koorts
BHP	Bij hoofdpijn
BJ	Bij jeuk
BK	Bij koorts
BKP	Bij koorts en/of pijn
BMSP	Bij menstruatiepijnen
BP	Bij pijn
ZN	Zo nodig
	104 - Locatie
AOOR	Achter het oor aanbrengen
VAGD	Diep vaginaal inbrengen
IBN	In beide neusgaten
IBNO	In beide neusgaten hoog opsnuiven
IBOG	In beide ogen
IBOR	In beide oren
HAA	In de haren en op de hoofdhuid
IOG	In het aangedane oog
IOR	In het aangedane oor
ILN	In het linker neusgat
ILOG	In het linker oog
ILOR	In het linker oor
IRN	In het rechter neusgat
IROG	In het rechter oog
IROR	In het rechter oor
ONOL	Onder het ooglid aanbrengen
HOO	Op de hoofdhuid
HUI	Op de huid
OPOL	Op het ooglid aanbrengen
VAG	Vaginaal aanbrengen
	105 - Gebeurtenis en ingreep
15MVI	15 minuten voor de inspanning
6VR	6 uur voor de reis aanbrengen
LUI	Bij iedere luierswisseling
HVZON	Een half uur voor zonnebaden aanbrengen
NIDEF	en na iedere ontlasting
NDEF	Na de ontlasting
VIN	Voor de ingreep
VEX	Voor het examen
MAP	zo spoedig mogelijk; max 72 uur na coitus
	106 - Cyclus
5-25	5e tot 25e dag van de cyclus

Memo	Omschrijving
16-25	16e tot 25e dag van de cyclus
19-25	19e tot 25e dag van de cyclus
3DVME	3 dagen voor de menstruatie beginnen
	107 - Wisselend gebruik in de tijd
1N2WH	1 nu, na 14 dagen herhalen
DOX	1e dag 2, daarna 1 maal daags 1
22111	2 dagen 2 per dag, daarna 1 per dag
2Z2U1	2 tegelijk, daarna zo nodig om de 2 uur 1
3D3WH	3 dagen; eventueel na 3 weken herhalen
1KDUB	Eerste maal een dubbele dosis
1W3WS	Gedurende 1 week, daarna 3 weken stoppen
3W1WS	Gedurende 3 weken, daarna 1 week stoppen
1W1D1	In de eerste week 1 maal daags 1
MWV	Maandag, woensdag en vrijdag
DDZ	Op dinsdag, donderdag en zaterdag
	108 - Dagdelen en gebruik per dagdeel
0-1-H	1 's middags, 1/2 's avonds
0-1-2	1 's middags, 2 's avonds
1-H-H	1 's morgens 1/2 's middags 1/2 's avonds
1-1-H	1 's morgens, 1 's middags, 1/2 's avonds
1-1-2	1 's morgens, 1 's middags, 2 's avonds
1-0-H	1 's morgens, 1/2 's avonds
1-H-0	1 's morgens, 1/2 's middags
1-H-1	1 's morgens, 1/2 's middags, 1 's avonds
1-H-2	1 's morgens, 1/2 's middags, 2 's avonds
1-0-2	1 's morgens, 2 's avonds
1-2-0	1 's morgens, 2 's middags
1-2-1	1 's morgens, 2 's middags, 1 's avonds
1-2-2	1 's morgens, 2 's middags, 2 's avonds
0-H-1	1/2 's middags, 1 's avonds
H-H-1	1/2 's morgens 1/2 's middags 1 's avonds
H-H-2	1/2 's morgens 1/2 's middags 2 's avonds
H-0-1	1/2 's morgens, 1 's avonds
H-1-0	1/2 's morgens, 1 's middags
H-1-1	1/2 's morgens, 1 's middags, 1 's avonds
H-1-2	1/2 's morgens, 1 's middags, 2 's avonds
H-0-2	1/2 's morgens, 2 's avonds
0-2-1	2 's middags, 1 's avonds
2-0-1	2 's morgens, 1 's avonds
2-1-0	2 's morgens, 1 's middags
2-1-1	2 's morgens, 1 's middags, 1 's avonds
2-1-H	2 's morgens, 1 's middags, 1/2 's avonds
2-1-2	2 's morgens, 1 's middags, 2 's avonds
2-0-H	2 's morgens, 1/2 's avonds
2-2-1	2 's morgens, 2 's middags, 1 's avonds
2-0-3	2 's morgens, 3 's avonds
3D12N	3 maal daags 1, 2 voor de nacht
3DH1N	3 maal daags 1/2, 1 voor de nacht
AV	's Avonds

Memo	Omschrijving
AVI	's Avonds innemen
AVT	's Avonds toedienen
MI	's Middags
MEA	's Middags en 's avonds
MO	's Morgens
MOI	's Morgens innemen
OEA	's Ochtends en 's avonds
OEM	's Ochtends en 's middags
OEVN	's Ochtends en voor de nacht
VN	Voor de nacht
	110 - Duur aanduiding
1C	Gedurende 1 cyclus
1W	Gedurende 1 week
10D	Gedurende 10 dagen
2W	Gedurende 2 weken
25D	Gedurende 25 dagen
3C	Gedurende 3 cycli
3D	Gedurende 3 dagen
4W	Gedurende 4 weken
5D	Gedurende 5 dagen
5W	Gedurende 5 weken
NH48U	Na herstel nog 48 uur voortzetten
2WNA	Tot 2 weken na genezing
3DNH	Voortzetten tot 3 dagen na herstel
	111 - Overigen
WRS15	Bij houden klacht na 15 min arts waarsch.
BMAAG	Bij maagklachten staken
DAZA	Dagzalf/-creme
1EDAV	Eerste dosis 's avonds innemen
LAXNK	Fors laxeren 1-2 uur na de kuur
NAZA	Nachtzalf/-creme
OVT	Op vast tijdstip
	112 - Herhalen
HH1	1 maal herhalen
HH10	10 maal herhalen
HH11	11 maal herhalen
HH12	12 maal herhalen
HH2	2 maal herhalen
HH3	3 maal herhalen
HH4	4 maal herhalen
HH5	5 maal herhalen
HH6	6 maal herhalen
HH7	7 maal herhalen
HH8	8 maal herhalen
HH9	9 maal herhalen
N1WH	Na 1 week herhalen
N2WH	Na 2 weken herhalen
ZN1UH	Zo nodig na 1 tot 1,5 uur herhalen
ZN1WH	Zo nodig na 1 week herhalen

Memo	Omschrijving
ZNN5H	Zo nodig na 5 tot 10 minuten herhalen
ZN6UH	Zo nodig na 6 uur herhalen
ZNKHH	Zo nodig na een kwartier herhalen
ZN5MH	Zo nodig om de 5 minuten herhalen
113 - Maximaal aanduidingen	
MX6U	Maximaal 6 uur tussentijd!
MX1W	Niet langer dan 1 week gebruiken
MX10D	Niet langer dan 10 dagen gebruiken
MX12U	Niet langer dan 12 uur per dag toepassen
MX5DG	Niet langer dan 5 dagen achtereen gebr.
MX10W	Niet meer dan 10 per week
MX2PD	Niet meer dan 2 per 24 uur
MX4PD	Niet meer dan 4 per 24 uur
MX4PW	Niet meer dan 4 per week
114 - Weekdagen	
MA	op maandag
DI	op dinsdag
WO	op woensdag
DO	op donderdag
VR	op vrijdag
ZA	op zaterdag
ZO	op zondag
115 - Gebruik	
IMM	Aan de arts afgeven 
GB	Gebruik bekend
VZK	Gebruik met voorzetskamer
VZKMM	Gebruik met voorzetskamer met masker
GVV	Gebruik volgens aanwijzing verloskundige
GVB	Gebruik volgens aanwijzingen bijsluiter
GVH	Gebruik volgens aanwijzingen huisarts
GVTA	Gebruik volgens aanwijzingen tandarts
GVSCH	Gebruik volgens schema
GVT	Gebruik volgens schema trombosedienst
GVTOE	Gebruik volgens toedienlijst 
GVS	Gebruik volgens voorschrift specialist
116 - Administratief	
N2WCO	Na twee weken controle
SPV	Specialistisch voorschrift
AFS	Volgende maal afspraak maken
117 - Adviezen en waarschuwingen	
1V2NN	1 uur voor en 2 uur na innemen niet eten
ND15M	15 min. voor en na gebruik niet drinken
2V1NN	2 uur voor en 1 uur na innemen niet eten
2V2NN	2 uur voor en 2 uur na innemen niet eten
3V3NN	3 uur voor en 3 uur na innemen niet eten
GRAPE	Bij dit middel GEEN grapefruit(sap) gebr.
NEMA	Bij maagklachten NA het eten innemen
BRP1W	Bij reuma/psoriasis 1xper wk op vaste dag

Memo	Omschrijving
BHNL	Binnen 30 min. na inname niet gaan liggen
BUNL	Binnen 60 min. na inname niet gaan liggen
HBK3W	Buiten koelkast max. 21 dagen houdbaar
20SMD	ca 20 sec in de mond houden, doorslikken
COIGD	Capsule mag open, korrels heel doorslikken
DABR	Dun op de huid aanbrengen
ZONUUV	Felle zon en UVlamp op de huid vermijden
GNALC	Gebruik geen alcohol bij dit middel
1UNNE	Gedurende 1 uur na innemen niet eten
MEEDR	Gemengd met eten of drinken innemen
FKVD	Goed fijnkauwen voor het doorslikken
GORGU	Gorgelen, daarna uitspugen
HEEL	Heel doorslikken, niet kauwen
MVITC	Hierbij max. 200 mg/dag vit. C toegestaan
BREEK	Indien nodig breken langs breukstreep
VEVO	Innemen met veel vocht
MVOE	Innemen met wat voedsel
VERKL	Kan de urine of stoelgang verkleuren
RIJV	Kan het reactievermogen verminderen
KUURS	Kan kuur met stopperiode(s) zijn
VERKM	Kan metaal verkleuren (bril, sieraden)
KFV	Kauwen of fijngemaakt met vocht innemen
KORHE	Korrels heel doorslikken, niet kauwen
KUUR	Kuur afmaken
OPZL	Langzaam opzuigen
LVGB	Lees voor gebruik de bijsluiter
CONTL	Let op: beschadigt zachte contactlenzen
LUCHT	Luchtbel niet verwijderen
VLEK	Maakt vlekken op kleding en linnengoed
MW	Met water innemen
MWNMM	Met water innemen, niet met melk
SPU	Mond spoelen, daarna uitspugen
HAWA	Na gebruik handen wassen
NGMS	Na gebruik mond spoelen
NGEZI	Niet in het gezicht toepassen
MX2W	Niet langer dan 2 weken gebruiken
ZUIV	Niet met zuivel innemen, zie bijsluiter
SMELT	Op de tong laten smelten, wegslikken
ALCO	Pas op met alcohol
ALCMA	Pas op met alcohol i.v.m. maagklachten
CITR	Pas op met citrusfruit, zie Apotheek.nl
GRAPF	Pas op met grapefruit, zie Apotheek.nl
VOEDS	Pas op met voedsel
VUUR	Pas op met vuur
BIJT	Pas op: bijtend middel
BLEKL	Pas op: bleekt kleding en linnengoed
BLEEK	Pas op: werkt blekend op haar en kleding
PLZON	Pleister niet aan zonlicht blootstellen
PLNAF	Pleister voor de nacht eraf, zie bijsl. ★

Memo	Omschrijving
OTSM	Tablet ONDER de tong laten oplossen
TABHE	Tabletdelen heel doorslikken
INHM	Ter inhalatie via de mond
INHNN	Ter inhalatie via de neus
VMMON	Vermijd mondhoeken, ooghoeken en neus
VGKAM	Voor gebruik op kamertemperatuur brengen
WANNA	Wanneer levodopa innemen? Zie apotheek.nl
ZSW	Zittend of staand innemen met veel water
ZOLA	Zo lang gebruiken als arts voorschrijft
	118 - Houdbaarheid
HB4MA	4 maanden houdbaar
HELD	Alleen gebruiken indien helder
BHZB	Beperkt houdbaar, zie bijsluiter ★
DONKR	Bewaar in het donker
LICHT	Bewaar in het licht
HB2WT	Bij kamertemperatuur 2 weken houdbaar
HB6MT	Bij kamertemperatuur 6 maanden houdbaar
HB6WT	Bij kamertemperatuur 6 weken houdbaar
HB9MT	Bij kamertemperatuur 9 maanden houdbaar
KAMER	Bij kamertemperatuur bewaren (15-25 C)
HBKBI	Buiten koelkast beperkt houdb, zie bijsl ★
HBK2W	Buiten koelkast max. 14 dagen houdbaar
HBK2M	Buiten koelkast max. 2 maanden houdbaar
HBK24	Buiten koelkast max. 24 uur houdbaar
HBK3D	Buiten koelkast max. 3 dagen houdbaar
HBK3M	Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar
HBK30	Buiten koelkast max. 30 dagen houdbaar
HBK4D	Buiten koelkast max. 4 dagen houdbaar
HBK4W	Buiten koelkast max. 4 weken houdbaar
HBK6M	Buiten koelkast max. 6 maanden houdbaar
HBK6W	Buiten koelkast max. 6 weken houdbaar
HBK7D	Buiten koelkast max. 7 dagen houdbaar
ELB10	Eluaat binnen 10 uur gebruiken
ELB8U	Eluaat binnen 8 uur gebruiken
HB1DR	Houdbaar tot 1 dag na ref.tijdstip
HB12K	Houdbaar tot 12 uur na ref.tijdstip
H12WR	Houdbaar tot 12 weken na ref.tijdstip
HB2WR	Houdbaar tot 14 dagen na ref.tijdstip
H2DR	Houdbaar tot 2 dagen na ref.tijdstip
HB2MR	Houdbaar tot 2 maanden na ref.tijdstip
HB20R	Houdbaar tot 20 uur na ref.tijdstip
H21DR	Houdbaar tot 21 dagen na ref.tijdstip
H24DR	Houdbaar tot 24 dagen na ref.tijdstip
HB4WR	Houdbaar tot 28 dagen na ref.tijdstip
HB3DR	Houdbaar tot 3 dagen na ref.tijdstip
HB36R	Houdbaar tot 36 uur na ref.tijdstip
HB4DR	Houdbaar tot 4 dagen na ref.tijdstip
HB6WR	Houdbaar tot 6 weken na ref.tijdstip

Memo	Omschrijving	
HB7DR	Houdbaar tot 7 dagen na ref.tijdstip	
HB9DR	Houdbaar tot 9 dagen na ref.tijdstip	
KOELK	In de koelkast bewaren (2-8 C)	
HKK30	In de koelkast max. 30 dagen houdbaar	
KOEKA	In de koelkast of bij kamertemp. bewaren	
KOEVR	In de koelkast of in de vriezer bewaren	
DIEPV	In de vriezer bewaren (beneden -15 C)	
VPBW	In deze verpakking bewaren	
IJS1U	In droog ijs tot 1 uur voor gebruik	
HB1JK	In koelkast 1 jaar houdbaar	
KOEEG	In koelkast bewaren na eerste gebruik	
KOEL	Koel bewaren (8-15 C)	
KOKAB	Koel of bij kamertemp. bewaren (8-25 C)	
HB1WA	Na aansluiten 1 week houdbaar	
H10ML	Na labelen 10 min houdbaar	
HB12L	Na labelen 12 uur houdbaar	
HB2UL	Na labelen 2 uur houdbaar	★
HBHUL	Na labelen 30 minuten houdbaar	
HB4UL	Na labelen 4 uur houdbaar	
HB6UL	Na labelen 6 uur houdbaar	
HB8UL	Na labelen 8 uur houdbaar	
KAMNL	Na labelen bij kamertemperatuur bewaren	
KOENL	Na labelen in koelkast bewaren	
NOB48	Na ontdooien binnen 48 uur gebruiken	
NOB72	Na ontdooien binnen 72 uur gebruiken	
HB1D	Na openen 1 dag houdbaar	
HB1J	Na openen 1 jaar houdbaar	
HB1M	Na openen 1 maand houdbaar	
HB1W	Na openen 1 week houdbaar	
HB10D	Na openen 10 dagen houdbaar	
HB10M	Na openen 10 maanden houdbaar	★
HB12U	Na openen 12 uur houdbaar (in koelkast)	
HB2J	Na openen 2 jaar houdbaar	
HB2M	Na openen 2 maanden houdbaar	
HB2W	Na openen 2 weken houdbaar	
HB24U	Na openen 24 uur houdbaar	
HB24K	Na openen 24 uur houdbaar (in koelkast)	
HB3D	Na openen 3 dagen houdbaar	
HB3J	Na openen 3 jaar houdbaar	
HB3M	Na openen 3 maanden houdbaar	
HB3W	Na openen 3 weken houdbaar	
HB4M	Na openen 4 maanden houdbaar	
HB4W	Na openen 4 weken houdbaar	
HB48U	Na openen 48 uur houdbaar	
HB5D	Na openen 5 dagen houdbaar	
HB5M	Na openen 5 maanden houdbaar	
HB5W	Na openen 5 weken houdbaar	
HB6M	Na openen 6 maanden houdbaar	

Memo	Omschrijving
HB6W	Na openen 6 weken houdbaar
HB7M	Na openen 7 maanden houdbaar
HB7W	Na openen 7 weken houdbaar
HB8W	Na openen 8 weken houdbaar
HBBIJ	Na openen beperkt houdbaar, zie bijsluiter
NOKAM	Na openen: bij kamertemperatuur bewaren
NO4W	Na oplossen 4 weken houdbaar in koelkast
NO6U	Na oplossen 6 uur houdbaar
NOPKO	Na oplossen in de koelkast bewaren
ONKOE	Onaangebrosen: in koelkast bewaren
RECHO	Rechttop bewaren
	119 - Bereidingsadviezen
TBFGM	De tablet mag worden fijngemalen
VDIGW	Dosis verdunnen in een glas water
OPLW	Eerst oplossen in water
UIEW	Eerst uiteen laten vallen in water
KOMS	Krchtig omschudden vlak voor gebruik
NOB6U	Na ontdooien binnen 6 uur gebruiken
OMR	Omroeren voor gebruik
OMS	Omschudden vlak voor gebruik
SR150	Op 150 ml vloeistof strooien, doorroeren
LTEMP	Op lichaamstemperatuur brengen voor gebr
OPLWL	Oplossen in water of limonade
VG1VD	Voor gebruik 1:1 verdunnen met water
VGOMK	Voor gebruik flacon enkele malen omkeren
VGMRO	Voor gebruik mengen door te rollen
VGOMZ	Voor gebruik ten minste 10x omzwenken
WTAPS	Water toevoegen aan poeder, schudden

Tekstcategorieën

Omschrijving	Toelichting
Maaltijden en slapen	Teksten die betrekking hebben op innametijdstoppen, gerelateerd aan de maaltijden en het slapen.
Toepassing	Teksten die toelichting geven op de juiste toepassing ('aanbrengen', etc.) van het middel
Conditie	Teksten die aangeven onder welke conditie het middel genomen mag worden ('bij pijn')
Locatie	Teksten die de locatie van het toe te passen middel aangeven ('in beide neusgaten')
Gebeurtenis en ingreep	Teksten die gerelateerd zijn aan een gebeurtenis of ingreep ('na de ontlasting')
Cyclus	Teksten gerelateerd aan de menstruele cyclus
Wisselend gebruik in de tijd	Teksten die aangeven dat na verloop van tijd het gebruik moet veranderen ('eerste dag dubbele dosis')
Dagdelen en gebruik	Teksten met betrekking op de verdeling over dag

per dagdeel	
Duur aanduidingen	Teksten die betrekking hebben op de duur van het gebruik ('gedurende drie dagen')
Overigen	Restcategorie
Herhalen	Teksten met betrekking tot herhaalafspraken
Maximaal aanduidingen	Teksten met betrekking tot het maximale gebruik (in hoeveelheid of duur)
Weekdagen	De zeven dagen van de week, voor middelen die op een specifieke weekdag moeten worden ingenomen.
Gebruik	Teksten met betrekking tot hoe het middel gebruikt moet worden ('gebruik volgens aanwijzingen bijsluiter')
Administratief	Teksten die een administratief doel dienen ('volgende maal afspraak maken')
Adviezen en waarschuwingen	Teksten die vanuit de G-Standaard als adviezen en waarschuwingen aan het geneesmiddel worden gekoppeld.
Houdbaarheid	Teksten die iets zeggen over de houdbaarheid van een geneesmiddel. Deze teksten zijn van praktisch belang voor de patiënt en de apotheker en worden vanuit de G-Standaard aan het geneesmiddel gekoppeld.
Bereidingsadviezen	Teksten die adviezen geven over de manier waarop het geneesmiddel voor toediening gereed gemaakt moet worden. Ook deze worden vanuit de G-Standaard aan het geneesmiddel gekoppeld.