

## NHG Tabel 45 Diagnostische bepalingen – toelichting bij versie 43

September 2024

Versie 43 van NHG-Tabel Diagnostische bepalingen bevat aanvullingen (19 nieuwe bepalingen en 3 nieuwe antwoordlijstjes), wijzigingen (4 bepalingen en 3 antwoordlijsten) en 3 vervallen bepalingen. Deze zijn beschreven in dit document.

### Inhoudsopgave

NHG Tabel 45 Diagnostische bepalingen – toelichting bij versie 43 .....	1
Stoppen met roken.....	2
Inschakelen zorg/verwijzing .....	2
Medicamenteuze behandeling.....	2
Begeleiding stoppen met roken .....	2
Zorgprofiel betreffende verpleging en verzorging .....	2
Venlafaxine .....	3
Diagnostiek diepe veneuze trombose en longembolie .....	3
YEARS risicoscore.....	3
Risicoscore diepe veneuze trombose (DVT).....	3
Risicoscore longembolie .....	3
Voetonderzoek diabetes .....	3
Grafische CCQ (Clinical COPD Questionnaire) .....	3
Valrisico .....	4
Diverse PCR bepalingen.....	4
eGFR MDRD variant.....	4

## Stoppen met roken

### Inschakelen zorg/verwijzing

Bij de bepaling 2139 ROVW AZ, inschakelen zorg/verwijz. stoppen met roken was de keuzelijst met mogelijke antwoorden:

- gedragstherapeut,
- groepscursus,
- stoppen-met-roken poli,
- stoppen met rokenbegeleider,
- overig

Hieraan is de keuze 'verslavingszorg' toegevoegd.

### Medicamenteuze behandeling

De keuzelijst met antwoorden bij 3949 MBSR AZ, medicament.behandeling stoppen met roken was:

- NVM – kauwgom
- NVM – pleister
- NVM – mondspray
- NVM – tabletten
- nortrypyline
- bupropion
- varenicline
- geen

(NVM = Nicotine vervangende middelen)

Hieraan is de nieuwe antwoordmogelijkheid 'cyticiniline' toegevoegd.

Cyticinicline wordt niet aanbevolen vanuit richtlijnen (toegevoegde waarde nog niet aangetoond), maar wordt in de praktijk gebruikt. Vandaar dat deze keuze is toegevoegd.

### Begeleiding stoppen met roken

Er is een nieuwe bepaling toegevoegd:

4158	BSMR AZ	begStopRo	begeleiding stoppen met roken
------	---------	-----------	-------------------------------

Met als beschikbare keuzes:

- zelfmethoden
- vanuit de huisartsenpraktijk
- extern

### Toelichting

*Bij zelfmethoden gaat het bijvoorbeeld om een app, een facebookgroep, online cursus of zelfhelpboek; bij externe hulp kan met bepaling 2139 ROVW AZ inschakelen zorg/verwijz. stoppen roken aangegeven worden welk soort hulpverlener of dienst wordt ingeschakeld; vanuit de huisartsenpraktijk kiest u wanneer de begeleiding vanuit de HA-praktijk wordt georganiseerd, door huisarts of POH.*

### Zorgprofiel betreffende verpleging en verzorging

Het zorgprofiel VV-10 wordt door het CIZ niet langer geïndiceerd. Daarom is de optie VV-10 verwijderd uit het keuzelijstje van bepaling 2803 zorgprofiel sector verpleging en verzorg. (De id voor deze antwoordkeuze blijft wel bestaan, zodat historische gegevens correct kunnen worden weergegeven). De toelichting bij de bepaling is hierop ook aangepast.

## Venlafaxine

De NHG-Tabel bevat al bepalingen voor venlafaxine en ook desmethylvenlafaxine. Nu is hieraan de bepaling toegevoegd voor venlafaxine totaal (+desmethylvenlafaxine).

4159	VLFT B SI	venlafTot	venlafaxine totaal (+desmethylvenlafax)
------	-----------	-----------	---

## Diagnostiek diepe veneuze trombose en longembolie

In de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eind 2023) is de YEARS-risicoscore toegevoegd. De oude risicoscore voor longembolie wordt niet meer gehanteerd en komt daarmee te vervallen.

### YEARS risicoscore

Nieuwe bepaling:

4160	YEAR KA FB	YEARS	YEARS-algoritme longembolie risicoscore
------	------------	-------	---

### Toelichting

*Het YEARS-algoritme voor longembolie risicoscore wordt beschreven in de NHG-Standaard diepe veneuze trombose en longembolie 2023. Er zijn verschillende vervolgstappen afhankelijk van het aantal YEARS-items (0-3).*

### Risicoscore diepe veneuze trombose (DVT)

Bij de bestaande bepaling is de toelichting aangepast naar:

*De beslisregel voor DVT wordt beschreven in de NHG-Standaard Diepveneuze trombose en longembolie 2023. Een risicoscore kleiner of gelijk aan 3 geldt als niet verhoogd, 4 of meer is wel verhoogd. Zie voor vervolgstappen de beslisregel.*

### Risicoscore longembolie

Bepaling 3662 risicoscore longembolie verwijst naar het vorige algoritme en risicoscore voor longembolie uit de voorgaande NHG-Standaard. Deze bepaling komt te **vervallen**. Voor de risicoberekening wordt nu het YEARS-algoritme gehanteerd.

## Voetonderzoek diabetes

Rondom voetonderzoek diabetes is een nieuwe bepaling toegevoegd waarmee vastgelegd kan worden wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het voetonderzoek.

4161	VODM LZ	voetOBij	voetonderzoek diabetes belegd bij
------	---------	----------	-----------------------------------

Met als beschikbare keuzes:

- POH
- voetenteam
- podotherapeut

## Grafische CCQ (Clinical COPD Questionnaire)

Naast de gewone, tekstuele CCQ is er inmiddels ook een grafische CCQ. De redactie van de vragen is iets anders en de antwoorden gaan vergezeld van gekleurde gezichtjes, die een uitdrukking hebben van zeer blij tot erg verdrietig.

Hoewel het principe gelijk is aan de 'gewone' CCQ vragenlijst, zijn er toch kleine verschillen, waardoor afgeraden wordt beide vragenlijsten door elkaar te gebruiken.

De huidige CCQ hebben we destijds opgenomen met een aparte bepaling voor elk van de tien vragen. Inmiddels nemen we bij dergelijke vragenlijsten geen individuele vragen meer op om de tabel niet onnodig te vullen. Nu is alleen de totaalscore van de grafische CCQ toegevoegd.

4162	GCCQ RQ MT	grafCCQto	totaalscore grafische CCQ
------	------------	-----------	---------------------------

## Valrisico

Bij ouderenzorg speelt het valrisico een grote rol. Als eerste stap wordt aanbevolen om een valrisicotest te doen. Wanneer daaruit komt dat het valrisico hoog is, kan een verdere valrisicobeoordeling plaatsvinden. Voor de valrisicotest is een nieuwe bepaling opgenomen.

4163	VRIT AA	valrisTst	valrisicotest
------	---------	-----------	---------------

## Toelichting

*Uitslag van de valrisicotest (zie [www.veiligheid.nl](http://www.veiligheid.nl)) waarmee je inschat of de cliënt een laag, matig of hoog valrisico heeft aan de hand van de valgeschiedenis, valangst en mobiliteitsstoornissen. Bij een hoog risico kan een verdere valanalyse/-beoordeling worden uitgevoerd.*

## Diverse PCR bepalingen

Virusbepalingen kunnen in diverse materialen bepaald worden. Als voor elke combinatie van een verwekker en een mogelijk materiaal een aparte bepaling zou worden vastgesteld zou dat leiden tot wel 400 nieuwe bepalingen. Uit deze lijst met mogelijke nieuwe bepalingen is een selectie gemaakt van bepalingen die relevant zijn voor de huisarts. Hiervoor zijn 13 nieuwe bepalingen gedefinieerd.

4164	ADVP FA	adenPCRoo	adenovirus DNA oog (PCR)
4165	CHPP RK	chlPnPCke	Chlamydia pneumoniae DNA keel (PCR)
4166	CHHP RS	chlPnPCsp	Chlamydia pneumoniae DNA sputum (PCR)
4167	PSIP RK	chlpsPCRk	Chlamydia Psittaci DNA keel (PCR)
4168	ENVP SE	EntVBlaP	Enterovirus RNA blaasjesvocht (PCR)
4169	ENVP FA	EntVOogP	Enterovirus RNA oog (PCR)
4176	ENVP RS	EntVSpuP	Enterovirus RNA sputum (PCR)
4170	MPPP RS	mycppnSpP	Mycoplasma pneumoniae DNA sputum (PCR)
4171	MPPP RK	mycppnKeP	Mycoplasma pneumoniae DNA keel (PCR)
4172	PARP RS	PareVSpuP	parechovirus RNA sputum (PCR)
4173	HEVI DF	HEVfcPCR	hepatitis E virus RNA faeces (PCR)
4174	VZVP DN	varzPCRmn	Varicella zoster virus DNA mond (PCR)
4175	VZVP FA	varzPCRoo	Varicella zoster virus DNA oog (PCR)

## eGFR MDRD variant

De MDRD variant voor het inschatten van de GFR is inmiddels opgevolgd door diverse vormen van de CKD-EPI variant. De MDRD zou niet meer gebruikt moeten worden voor nieuwe bepalingen. Hiermee **vervallen** de volgende bepalingen:

- 1919 KREM O FB eGFR volgens MDRD formule
- 3740 KREM O PO eGFR volgens MDRD POC-test